



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرستشی
سازمان بهداشت
مرکز ملی جهیزت ملکت خانوار و مدارس

فرزندآوری، فرصت ناب زندگی



مراقبت های کودکان فرصتی بی بازگشت، پنجه ای رو به آینده

| سن | تاریخ مراجعه | لیست مراقبت های بهداشتی کودکان | تاریخ مراجعه بعدی |
|-------------|--------------|---|-------------------|
| ۳-۵ روزگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه، غربالگری شیرمادر و بیماری های متابولیک، ارزیابی شنوایی، معاینه پزشک، تجویز مکمل | |
| ۱۴-۱۵ روزگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه انحصاری با شیرمادر، ارزیابی بینایی، ارزیابی شنوایی، تجویز مکمل | |
| ۳۰-۴۵ روزگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه انحصاری با شیرمادر، ارزیابی شنوایی، تجویز مکمل | |
| ۲ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه انحصاری با شیرمادر، واکسیناسیون، ارزیابی بینایی، ارزیابی شنوایی، بررسی عالم کلیدی تکامل، تجویز مکمل | |
| ۴ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه انحصاری با شیرمادر، واکسیناسیون، ارزیابی شنوایی، تجویز مکمل | |
| ۶ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه انحصاری با شیرمادر و تقدیه تکمیلی، واکسیناسیون، ارزیابی شنوایی، بررسی دهان و دندان، ارائه پرسشنامه های تکامل، آموزش استفاده از مسوک انگشتی، ارزیابی شنوایی، معاینه پزشک، تجویز مکمل | |
| ۷ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی بینایی، ارزیابی شنوایی، تجویز مکمل | |
| ۹ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، بررسی عالم کلیدی تکامل، تجویز مکمل | |
| ۱۲ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، واکسیناسیون، آموزش استفاده از مسوک انگشتی، ارزیابی دهان و دندان، ارائه پرسشنامه های تکامل، معاینه پزشک، معاینه دندانپزشک، تجویز مکمل | |
| ۱۵ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، تجویز مکمل | |
| ۱۸ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد، وزن و دورسر)، ارزیابی تغذیه، واکسیناسیون، ارزیابی شنوایی، آموزش استفاده از مسوک انگشتی، بررسی عالم کلیدی تکامل، تجویز مکمل | |
| ۲۴ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد و وزن)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی دهان و دندان، ارائه پرسشنامه های تکامل، معاینه پزشک، تجویز مکمل | |
| ۳۰ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد و وزن)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، ارزیابی دهان و دندان، ارائه پرسشنامه های تکامل، معاینه پزشک، ارزیابی شنوایی | |
| ۳۶ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد و وزن)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، ارزیابی دهان و دندان، ارائه پرسشنامه های تکامل، معاینه پزشک، اندازه گیری فشارخون توسط پزشک، معاینه دندان پزشک | |
| ۴۸ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد و وزن)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، ارزیابی دهان و دندان، بررسی وضعیت بینایی، بررسی عالم کلیدی تکامل | |
| ۶۰ ماهگی | | پایش رشد (اندازه گیری قد و وزن)، ارزیابی تغذیه، ارزیابی شنوایی، واکسیناسیون، ارزیابی شنوایی، ارزیابی دهان و دندان، ارائه پرسشنامه های تکامل، معاینه پزشک، معاینه دندان پزشک | |

دفترچه پایش مراقبت کودک دختر (نارس)

در هر مراجعته به واحد بهداشتی درمانی/مطب/مرکز غربالگری دفترچه مراقبت کودک را به همراه داشته باشید.



فرزنдан بیشتر، نشاط امروز آسایش فردا

| |
|--|
| نام و نام خانوادگی کودک:..... |
| تاریخ تولد: روز..... ماه..... سال..... |
| کد ملی کودک: |
| کد شناسه سامانه الکترونیکی * : |
| کد ملی سرپرست کودک: |
| مشخصات زمان تولد: وزن..... دور سر..... قد..... |
| هفته بارداری هنگام زایمان: |
| تلفن تماس: |

- غربالگری پس از تولد، روز سوم تا پنجم انجام می شود و تکرار آن در ۲، ۶ و ۱۰ هفتگی پس از تولد انجام می شود.
- در صورت ترجیح، نوزادان تا رسیدن به وزن ۲۰۰۰ گرم، هفتگی مراقبت شوند و پس از آن در ۱، ۴، ۷، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ ماهگی و سپس در ۲، ۳، ۴، ۵ سالگی برای مراقبت کودک مراجعه کنید.
- در سنین ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۸ ماهگی و ۵-۶ سالگی برای واکسیناسیون کودک خود مراجعه کنید.

* کد شناسه الکترونیکی: این کد باید پس از دریافت کد ملی کودک در اولین فرصت ویرایش گردد و در کودکان بدون کدمی با همین کد، ارائه خدمات ادامه یابد.

تکامل بیشتر کودک در بازی با همسالان

- شیر مادر هیچ جایگزینی ندارد. تا پایان ۶ ماهگی کودکتان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید و پس از آن مطابق توصیه های تغذیه ای، غذای کمکی را شروع کرده و شیر مادر را تا دو سالگی ادامه دهید.
- به علائم هشدار دهنده تکامل کودک در سنین مختلف توجه کنید.
- به توصیه های مراقبت از تکامل کودک عمل کنید.
- پرسشنامه غربالگری تکامل ASQ را در سنین اصلاح شده ۲، ۶، ۱۲، ۱۸، ۲۴، ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماهگی کودکتان از پزشک / مراقب سلامت / بهورز دریافت کنید. بعد از تمرین مناسب با کودکتان طبق بروشورهای دریافتی، به سوالات پرسشنامه به دقت پاسخ دهید و سپس تحويل دهید.
- سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.
- مکان نگهداری نوزاد در منزل کم نور، دنج و بدون سر و صدا باشد.
- از کارهای پر سر و صدا بر بالین نوزاد خودداری نمایید.
- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد باعث دلبرستگی مادرانه، افزایش قابل توجه شیر مادر، کاهش اضطراب مادر، افزایش رشد شناختی شیرخوار، تنظیم دمای بدن، تنفس و ضربان قلب نوزاد، ارتباط متقابل مادر و شیرخوار و در نهایت سرعت رشد جسمی، ارتقای تکامل و شکوفایی استعدادهای بالقوه شیرخوار می شود.

رسول خدا ﷺ: فرزند صالح گلی خوش بو از جانب خداوند است که بین بندگانش تقسیم کرده است.

غربالگری‌های کودک

| آزمون غربالگر | تاریخ انجام غربالگری | نتیجه غربالگری | نیازمند ارجاع | نام یا مهر غربالگر |
|---|----------------------|----------------|---------------|--------------------|
| هیپوتیروئیدی | | | | |
| فنیل کتونوری | | | | |
| شنوازی | | | | |
| بینایی | | | | |
| معاینه چشم (رتینوپاتی نوزاد نارس) (ROP) | | | | |

فرزندان، همدم امروز، یاور فردا

| نیازمند ارجاع | تاریخ تکمیل پرسشنامه | پرسشنامه ASQ SE | نیازمند ارجاع | تاریخ تکمیل پرسشنامه | پرسشنامه ASQ |
|---------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | ۲ ماهگی | | | ۲ ماهگی |
| | | ۶ ماهگی | | | ۶ ماهگی |
| | | ۹ ماهگی | | | ۹ ماهگی |
| | | ۱۲ ماهگی | | | ۱۲ ماهگی |
| | | ۱۸ ماهگی | | | ۱۸ ماهگی |
| | | ۲۴ ماهگی | | | ۲۴ ماهگی |
| | | ۳۶ ماهگی | | | ۳۶ ماهگی |
| | | ۴۸ ماهگی | | | ۴۸ ماهگی |
| | | ۶۰ ماهگی | | | ۶۰ ماهگی |

جامعه جوان‌تر، زندگی بهتر با فرزندآوری بیشتر

| سن | نوع واکسن | سن | نوع واکسن |
|----------|---|-----------|-------------------------------|
| بدو تولد | ب ث ژ - فلج اطفال خوارکی - هپاتیت ب | ۱۲ ماهگی | پنوموکوک |
| ۲ ماهگی | فلج اطفال خوارکی - پنج گانه* - روتاویروس - پنوموکوک | ۱۸ ماهگی | MMR |
| ۴ ماهگی | فلج اطفال خوارکی - پنج گانه - فلح اطفال تزریقی - روتاویروس - پنوموکوک | ۵-۶ سالگی | سه‌گانه*** - فلح اطفال خوارکی |
| ۶ ماهگی | فلج اطفال خوارکی - پنج گانه - فلح اطفال تزریقی - روتاویروس - سرخک** | | |

توضیحات: * واکسن پنج گانه شامل دیفتتری، کراز، سیاه‌سرفه، هپاتیت ب، هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب می‌باشد.
 ** این واکسن در حال حاضر با نوجه به مصوبه کمیته کشوری ایمن سازی در بعضی از استان‌های خاص حسب ابلاغ مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشکی در سن ۶ ماهگی تزریق می‌گردد.
 *** پس از آخرین نوبت واکسن سه‌گانه، هر ده سال یکبار واکسن دوگانه بزرگسالان باید تزریق شود.

جدول تقویم واکسیناسیون

| ب ث ژ (BCG) | فلج اطفال خوارکی (OPV) | رنوکوک (IPV) | فلج اطفال تزریقی (IPV) |
|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| بدو تولد | بار اول | DTP-Hep-B- پنج گانه (Hib) | بار اول |
| بدو تولد | بار دوم | DTP- پنج گانه | بار دوم |
| بار اول | بار سوم | DTP/DTaP پنج گانه | بار سوم |
| بار اول | بار دوم | MMR | یادآور ۱ |
| بار اول | بار دوم | روتاویروس | یادآور ۲ |
| بار اول | بار دوم | هپاتیت ب | بار اول |
| بار دوم | بار سوم | سرخک (M) | بار دوم |
| | | نوبت صفر | |

دولت در آن سراست، که از کودکان پر است.

- منفذیه با شیر مادر برای تقویت سیستم ایمنی، رشد و تکامل شیرخواران بسیار اهمیت دارد.
شیر مادر به تنهایی تا بیان ماه ششم زندگی برای تغذیه شیرخواران کافی است، تا سالگی ادامه دهد.
که همانگی تا بیان ماه سالگی ایندیا گودکنات را با شیرمادر تغذیه کنید و سپس به او غذا بدهید.
تغذیه تکمیلی وازیک نوع ماده غذایی به مقادیر اول تا ۲ قاشق هر باخوری ۲ بار در روز شروع کنید و سپس این
تجددیاره را تصفیه لیوان برسانید.
صنایع کدن هر ماده غذایی جدیدی را طی ۵ روز انجام دهد.



הנִזְקָנָה

شروع میاه هفت
م تا پایان ماه بیازدهم

卷之三



کودکان، سرمايه ملت ها

دوازده ماهگی تا پایان پنج سالگی



- شیر مادر را بطبق میل کودک تا ۲ سالگی ادامه دهید. تا پایان ۱۲ ماهگی ابتدا شیرمادر و سپس غذای کمکی بدھید و پس از آن ابتدا به کودکتان غذا بدھید و سپس او را با شیر مادر تغذیه کنید.
- از «به زور غذا دادن به کودکتان» پرهیز کنید.
- غذاهای متنوع شامل لبندیات، گوشت، میوه و سبزی، غلات و حبوبات بدھید.
- تا ۲ سالگی لبندیات پر چرب و پس از آن لبندیات کم چرب بدھید.
- طی روز آب تمیز و سالم به کودک بدھید.
- سه تا چهار نوبت در روز و هر نوبت تقریباً به اندازه یک لیوان به کودک غذا بدھید. (معده کودک کوچک است و نیاز به دفعات بیشتری برای تغذیه دارد.)
- یک تا دو بار میان وعده مغذي در بین وعده های اصلی غذا به او بدھید.
- قطره ویتامین و آهن را تا پایان ۲ سالگی ادامه دهید.
- زمان غذا خوردن کنار کودکتان باشید.
- غذا را در قطعات کوچک آماده کرده و به کودک بدھید «تا بتواند خودش آن ها را بخورد»
- همیشه پیش از تهیه غذا و قبل از دادن غذا به کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید.
- پیش از دادن غذا به کودک دست و صورت او را بشویید و از ظرف و فاشق تمیز و جداگانه برای کودک استفاده کنید.
- دادن غذاهای آماده و تجاری به کودک ضرورت ندارد، غذاهای خانگی مناسب هستند. از غذاهای سفره خانواده به کودک بدھید.
- به کودکتان آب میوه و نوشیدنی های تجاری ندهید. این ها ارزش غذایی نداشته و به رشد کودک کمک نمی کنند.
- به کودکتان غذاهای غیر سالم مانند چیپس و پفک ندهید.

رسول اکرم ﷺ : کودکان را دوست بدارید، به آنها مهربانی کنید و هرگاه به آنها وعده دادید وفا کنید.

علائم هشدار دهنده تکامل

| | | | |
|--|----------|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند با کمک بینشید. • غان و غون نمی کند (دراوردن صداهایی مانند «ماما»، «بابا»، «دادا») • در هیچ نوع بازی از جمله بازی تعاملی شرکت نمی کند. • با شنیدن اسم خودش، پاسخی نمی دهد. • به نظر نمی رسد افراد آشنا را از غریبه ها تشخیص دهد. • به طرفی که شما اشاره می کنید نگاه نمی کند. • اشیا را دست به دست نمی کند. | 9 ماهگی | <ul style="list-style-type: none"> • به صداهای بلند پاسخ نمی دهد. • اشیایی در حال حرکت را با نگاه دنبال نمی کند. • به اشخاص لبخند نمی زند. • دستش را به دهان نمی برد. • وقتی روی شکم خواهد و او را از زمین بلند می کنیم نمی تواند سرش را بالا بیاورد. • مکیدن یا بعیدن ضعیف دارد. | 2 ماهگی |
| <ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند چهار دست و پا ببرود. • نمی تواند با کمک بایستد. • برای پیدا کردن اشیایی که می بیند شما آن ها را پنهان می کنید تلاش نمی کند. • کلمه کوتاه مثل ماما یا بابا را نمی گوید. • بای بای یا سرسری کردن را یاد نمی گیرد. • به اشیا اشاره نمی کند. • مهارت هایی را که قبل اکسب کرده از دست می دهد. | 1 سالگی | <ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند سرش را ثابت نگه دارد. • نمی تواند بغفوکند یا صداهای دیگری با دهانش تولید کند. • وقتی او را به حالت ایستاده روی یک سطح سفت قرار دهیم، نمی تواند با پاهایش به سمت پایین فشار وارد کند. • نمی تواند یک یا هر دو چشمش را در همه جهات حرکت دهد. | 4 ماهگی |
| <ul style="list-style-type: none"> • با اشاره کردن به سمت اشیا، آن ها را به دیگران نشان نمی دهد. • نمی تواند راه برود. • موارد کاربرد اشیای آشنا را نمی داند. • نمی تواند کارهای دیگران را تقلید کند. • کلمات جدید را یاد نمی گیرد. • نمی تواند حدائق ۶ کلمه بگوید. • وقتی مراقب او را ترک می کند یا پیش او برمی گردد، توجه نمی کند یا اهمیت نمی دهد. • مهارت هایی را که قبل از دست آورده بود از دست می دهد. | 18 ماهگی | <ul style="list-style-type: none"> • تلاش نمی کند که دستش را به اشیایی که در دسترس قرار دارند برساند. • توجهی به مراقب خود نمی کند. • به صداهای اطرافش واکنش نشان نمی دهد. • به هیچ طرف غلت نمی زند. • نمی خنده یا جیغ نمی کشد. • عضلاتش به نظر خیلی سفت می رسد. • عضلاتش به نظر خیلی شل است (مثل یک عروسک پارچه ای) | 6 ماهگی |

برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند، تا ۲ سالگی سن اصلاح شده آنها محاسبه شود. سن اصلاح شده کودک را از پزشک / مراقب سلامت / بهورز سوال کنید.

فرزند امروز، تکیه گاه فردا

علام هشدار دهنده نکمال


| | |
|--|---|
| علماء هشدار دهنده نکمال | ۲ سالگی |
| <ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند درجا بپرد. • سایر کودکان را نادیده می گیرد یا به افرادی غیر از اعضای خانواده، پاسخ نمی دهد. • در مقابل لباس پوشیدن، خوابیدن یا دستشویی رفتن مقاومت می کند. • نمی تواند یک داستان مورد علاقه اش را بازگویی کند. • نمی تواند از دستورات ۳ مرحله ای پیروی کند. • مفهوم «همان / مشابه» و «متفاوت» را درک نمی کند. • از ضمایر من و تو درست استفاده نمی کند. • گفتار واضحی ندارد. • مهارت هایی را که قبل از دست آورده بود از دست می دهد. | <ul style="list-style-type: none"> • از عبارت های ۲ کلمه ای استفاده نمی کند (مثل: شیر می خورم) • کاربرد اشیای معمولی مثل مسواک، تلفن یا قاشق و چنگال را نمی دارد. • قادر به انجام دستورات ساده نیست. • خودش به تنها یار نمی رود. • مهارت هایی را که قبل از دست می دهد. |
| <ul style="list-style-type: none"> • نمی تواند طیف وسیعی از عواطف را نشان دهد. • رفتارهای افرطی از خود نشان می دهد مثل حالت های غیرمعمول ترس، خجالت، افسردگی یا رفتار تهاجمی • معمولاً گوشش گیر و غیرفعال است. • براحتی حواسش پرت می شود و نمی تواند بیش از ۵ دقیقه روی یک موضوع تمکز کند. • به مردم پاسخ نمی دهد یا پاسخ سرسری می دهد. • قادر به انجام بسیاری از بازی ها و فعالیت ها نیست. • نمی تواند نام و نام خانوادگی خود را بگوید. • نمی تواند افعال جمع یا گذشته را درست بکار ببرد. • نمی تواند در مورد فعالیت های روزانه یا تجارتی صحبت کند. • نمی تواند نقاشی بکشد. • نمی تواند بدون کمک دندانش را مسواک کند، دست و صورتش را بشوید و خشک کند یا لباس پوشد. • مهارت هایی که قبل از دست می دهد. | <ul style="list-style-type: none"> • زیاد زمین می خورد یا نمی تواند از پله استفاده کند. • آبیزش دهان دارد یا گفتارش خیلی نامفهوم است. • نمی تواند با اسباب بازی های ساده مانند جورچین ساده بازی کند. • نمی تواند جمله بگوید. • بازی تخیلی نمی کند یا آن ها را باور می کند. • نمی خواهد با سایر کودکان یا اسباب بازی های بازی کند. • تماس چشمی برقرار نمی کند. • مهارت هایی را که قبل از دست می دهد. |

مادر شدن، زیباترین شادی دنیاست

توصیه‌های ارتقای تکامل کودک

| توصیه های ارتقای تکامل کودک | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| ۲ سال و بزرگتر | ۱۲ ماه تا ۲ سال | ۹ ماه تا ۱۲ ماه | ۶ ماه تا ۹ ماه | ۱ هفته تا ۶ ماه | تولد تا یک هفتگی |
|  <p>بازی: به کودک خود کمک کنید تا اشیا را بشمارد، نام ببرد و مقایسه کند. برای او اسباب بازی های ساده بسازید. مثلاً اشیایی با رنگ ها و شکل های مختلف برای دسته بندی، بر چسب یا تخته وایت برد و پازل.</p> |  <p>بازی: چیزهایی به کودک بدھید تا روی هم بچیند و داخل ظرف بیاندازد و در بیاورد.</p> |  <p>بازی: اسباب بازی مورد علاقه کودک را زیر پارچه یا جعبه پنهان کنید. بینند آیامی تواند آن را پیدا کند. با کودک خود دالی و موشه بازی کنید.</p> |  <p>بازی: وسائل خانگی تمیز و کوچک خطری را به کودک خود بدھید تا دستکاری کند، به هم بزنده و بیاندازد (مانند ظروف درب دار، قابلمه و قاشق فلزی).</p> |  <p>بازی: فرصت هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا بینند، بشنوند، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را لمس کند. اشیای رنگی را به آرامی جلوی او را حرکت دهید تا آن را بینند و بگیرد (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه).</p> |  <p>کودک شما از زمان تولد در حال یادگیری است</p> |
|  <p>ارتباط برقرار کنید: اورا تشویق کنید تا صحبت کند و به سوالات او پاسخ دهد. به کودکان داستان، اوار و بازی بپردازد. در مرور تصاویر یا کتاب ها با او صحبت کنید. نمونه اسباب بازی: کتاب شکل دار</p> |  <p>ارتباط برقرار کنید: سوالات ساده از کودک بپرسید. و به تلاش های کودک را به کودک بگویید. به او یاد بدھید که چگونه با دست هایش اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهد و درباره آن ها با او صحبت کنید.</p> |  <p>ارتباط برقرار کنید: نام اشیا و افراد را به کودک بگویید. به تلاش های کودک خود در صحبت کردن جواب بدھید. اشیا، طبیعت و تصاویر را به او نشان دهد. نمونه اسباب بازی: عروسکی با صورت</p> |  <p>ارتباط برقرار کنید: به صدا و علائق کودک خود چیزهایی مثل بیاندازید. با پاسخ دهد. نام کودک را صدا کنید و پاسخ او بینند.</p> |  <p>ارتباط برقرار کنید: به کودک خود لبخند بزنید و زمان تقدیمه با شیر مادر فرصت خوبی است. حتی یک نوزاد تقلید صدا یا ریشت کودکان با هم صورت شماری می بینند و او مکالمه کنید.</p> |  <p>ارتباط برقرار کنید: به چشمکن کودک خود نگاه کنید و با او صحبت کنید.</p> |
| <p>تلاش کودکان را در یادگیری مهارت های جدید تحسین کنید. از علائق کودک خود مطلع شوید و به آن ها پاسخ دهد. به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به انشان دهد.</p> | | | | | |


نمودار قد و دورسر شیرخواران زود متولد شده دختر



نمودار قد و دورسر شیرخواران زود متولد شده دختر


نمودار وزن شیرخواران زود متولد شده دختر

۲



سین به مشنه از اوایل روز آنکه قاعده‌ی

نمودار دور سربای سن از تولد تا ۲ سالگی (Z-score) دختر




برای کودکانی که زودتر از ۳۷ هفته بارداری به دنیا آمده اند تا ۱۸ ماهگی سن اصلاح شده محاسبه شود.

The Multicenter Growth Reference Study (MGRS) 2006 (WWW.WHO. INT/CHILDGROWTH)

نمودار وزن برای قد از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) دختر




نمودار قد برای سن از تولد تا ۵ سالگی (Z-Score) دختر



نمودار وزن برای سن دختر از تولد تا ۵ سالگی (Z-score)



اگر شیرخوار/کودک شما این علایم را دارد فوراً به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید:



- تب طول کشیده یا تب غیر قابل کنترل دارد.
- قادر به شیرخوردن یا نوشیدن نیست.
- هر چیزی که می خورد استفراغ می کند.
- اسهال شدید دارد.
- خواب آلودگی غیر عادی دارد و هوشیار نیست.
- بی قراری شدید دارد.
- تنفس سخت و نامنظم یا خیلی تنددار دارد.
- تشنج می کند.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرستی
دعاونت بهداشت



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرستی
دعاونت بهداشت
مرکز جوانی جمهوری، سلامت خانواده و مدارس

امام صادق علیه السلام فرمودند: حضرت موسی به خداوند عرض کرد: خداوندا چه عملی نزد تو برترین است؟
خداوند متعال فرمود: دوست داشتن کودکان»

